

تأثیر تاریخ کاشت و غلظت‌های مختلف جنس‌تین روی تثبیت نیتروژن و گره‌زایی سه گونه یونجه یک‌ساله

مجید امینی دهقی^{۱*}، علی سپهری^۲ و خسرو عزیزی^۳

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و جنس‌تین روی تثبیت نیتروژن و گره‌زایی، سه گونه یونجه یک‌ساله، آزمایشی در شرایط مزرعه در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳ انجام گرفت. گونه‌های مورد مطالعه شامل *M. polymorpha* و *M. rigidula gradiate* بودند که با مناطق سرد و معتدل‌های سازگاری دارند. آزمایش در قالب طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوک‌های کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. تاریخ کشت در سه سطح اول و دهم و بیستم اسفندماه به عنوان کرت‌های اصلی و گونه‌های یونجه یک‌ساله به عنوان کرت‌های فرعی و جنس‌تین در دو سطح صفر و ۲۰ میکرومول در لیتر در کرت‌های فرعی در نظر گرفته شد. نتایج حاکی از آن بود که در سال اول، رشد و نمو، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن بیش‌تری نسبت به سال دوم به دلیل شرایط دمای مناسب اوایل فصل رشد مشاهده شد. گونه‌ها از لحاظ تثبیت نیتروژن، گره‌زایی و سایر صفات مورد بررسی تفاوت معنی‌داری داشتند. گونه‌ی *M. polymorpha* نسبت به دو گونه دیگر از نظر میزان تثبیت نیتروژن و گره‌زایی، میزان ماده‌ی خشک ریشه و درصد نیتروژن برتر بود. در تاریخ کشت سوم با مطلوب‌تر شدن دمای هوا و خاک، بیش‌ترین مقدار گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در گونه‌ها مشاهده گردید. اما در تاریخ کشت اول به دلیل تاثیر دمای پایین هوا و خاک، کمترین میزان گره‌زایی و تثبیت نیتروژن ایجاد شد. استفاده از جنس‌تین تاثیر افزاینده‌ای روی گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در هر سه گونه داشت که حاکی از اثر تعدیل کنندگی جنس‌تین و کاهش تاثیر منفی دمای پایین محیط روی گره‌زایی و تثبیت نیتروژن یونجه یک‌ساله بود. بررسی اثرات متقابل تیمارهای اعمال شده نشان‌داد که استفاده از جنس‌تین در تاریخ کشت اول باعث افزایش گره‌زایی و تثبیت نیتروژن شده که این امر بیان گر تاثیر جنس‌تین در ایجاد مقاومت به سرما برای بهبود گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در هر سه گونه یونجه یک‌ساله در شرایط مزرعه بود.

کلمات کلیدی: یونجه یک‌ساله، تاریخ کشت، تثبیت نیتروژن، جنس‌تین، گره‌زایی

۱. استادیار گروه زراعت، دانشکده‌ی علوم کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران

۲. استادیار گروه زراعت، دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

۳. استادیار گروه زراعت، دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

*: نویسنده مسؤول

مقدمه

تمامین می‌گردد (کروکر و هولفورد، ۱۹۹۶). همین توانایی سبب بهبود حاصل خیری خاک شده و باعث افزایش عملکرد گندم در سیستم غله- لگوم به میزان بیش از ۵۰ درصد می‌شود (کاونتری، ۱۹۹۳). در استرالیا با استفاده از یونجه‌های یکساله حدود ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن به خاک اضافه می‌شود (ماترون و کوکس، ۱۹۸۸). یونجه‌های یکساله علاوه بر ازدیاد نیتروژن آلی خاک، باعث افزایش کربن آلی خاک نیز می‌شوند (دالال و همکاران، ۱۹۹۵).

رشد رویشی یونجه‌های یکساله از اواخر پاییز با اولین بارندگی زمستانه و جوانه‌زدن بذر شروع و تا فصل بهار ادامه می‌یابد، سپس گیاه وارد مرحله‌ی زایشی می‌شود ولی در مناطق با زمستان سرد و داشتن دوره‌های یخ‌بندان شروع رشد و جوانه‌زدن بذر به اوایل فصل بهار موكول می‌گردد (والش و همکاران، ۱۹۹۸). درجه حرارت مناسب خاک برای جوانه‌زنی بذر یونجه‌های یکساله حدود ۱۰ تا ۱۶ درجه سانتی‌گراد و دمای هوا حدود ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد است (مویکو، ۱۹۹۳). تحمل یونجه‌های یکساله نسبت به سرمای زمستان کم است و نمی‌توانند یخ‌بندان‌های شدید و طولانی را تحمل کنند. دمای مطلوب دوره‌ی رشد رویشی یونجه ۲۱ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد و در مرحله گلدنه ۱۵ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد می‌باشد (هانسون، ۱۹۸۸). این گیاه صفر درجه سانتی‌گراد را حداقل تا ۸ ساعت به طور ممتد تحمل کرده و بعد از بین می‌رود (پوکریچ و فرنچ، ۱۹۸۳).

یونجه‌های یکساله از نظر نیاز رطوبتی، بسیار کم توقع بوده و در بسیاری از نقاطی که بارندگی سالیانه کمتر از ۲۵۰ میلی‌متر داشته اقدام به کشت آن‌ها گردیده است (برهیم و اسمیت، ۱۹۹۳). کشت یونجه‌های یکساله در سیستم تناوبی غله- لگوم به‌طور گسترده در مناطق دارای آب و هوای مدیترانه‌ای در بسیاری از نقاط جهان توسعه یافته و موفقیت‌آمیز بوده است (هولفورد و همکاران، ۱۹۹۷). حضور و فراوانی یونجه‌های سازگار با آن محیط باشد (اهرمن و کوکس، ۱۹۹۰).

یونجه‌های یکساله می‌توانند جایگزین آیش شده و ضمن حاصل خیز نمودن خاک، از فرسایش آن جلوگیری نمایند (بایدریک و همکاران، ۱۹۹۳). در سیستم تناوبی گندم - یونجه یکساله، میزان نیتروژن تثبیت شده به حدی است که نیاز نیتروژن، گندم تمامین می‌شود (داگتون و همکاران، ۱۹۹۶). یونجه‌های یکساله از جهاتی نسبت به گونه‌های چند ساله برتری دارند. بیشتر گونه‌های یونجه یکساله، سریع‌تر از یونجه‌های چند ساله رشد کرده (شرستا و همکاران، ۲۰۰۱) و دارای سازگاری وسیع با شرایط آب و هوایی مختلف هستند، این ویژگی‌ها آن‌ها را جای‌گزین گونه‌های دائمی یونجه نموده است (مویکو، ۱۹۹۳). در بعضی کشورهای پیشرفته یونجه‌های یکساله جزء جدائی ناپذیر سیستم‌های زراعی محسوب می‌شوند و به دلیل توانایی در تثبیت نیتروژن و حاصل خیز کردن خاک و نسبت پایین کربن به نیتروژن نقش مهمی در نظامهای کشاورزی پایدار دارند (کاترتون و کاترتون، ۱۹۹۴).

یونجه‌های یکساله یکی از اجزای اصلی در کشاورزی پایدار هستند و قادرند با یک چین علوفه در مرحله‌ی ۶۰ تا ۷۰ روز بعداز کاشت حدود ۵ تا ۶ تن علوفه‌ی خشک در هکتار تولید نمایند (باوچان و همکاران، ۲۰۰۰). گزارش شده که اجرای سیستم تناوبی گندم- یونجه یکساله به مراتب از سایر سیستم‌های زراعی اقتصادی‌تر است و هم‌چنین با استفاده از این سیستم نه تنها میزان پروتئین گندم افزایش می‌یابد بلکه در گسترش بیماری‌های قارچی نیز وقفه ایجاد می‌کند (دالال و همکاران، ۱۹۹۵). تعداد زیادی از گونه‌های یونجه یکساله به عنوان کود سبز نیز مورد کشت قرار می‌گیرند (سیمس و همکاران، ۱۹۸۵). اجرای سیستم تناوبی غله- لگوم در زمین‌های تحت کشت غلات دیم در کشور استرالیا باعث افزایش حاصل خیزی خاک، افزایش تولید علوفه دام و بهبود و توسعه مراعع شده است.

یونجه‌های یکساله منبع بسیار خوبی برای تثبیت بیولوژیکی نیتروژن هوا (N_2) هستند. ۶۵٪ از کل نیتروژن مصرفی در کشاورزی از طریق تثبیت بیولوژیکی

سرما، گرما و تنש‌های رطوبتی نیز تا اندازه زیادی موجب کاهش جمعیت ریزوبیومها در حوزه فعالیتشان روی ریشه یونجه‌های یکساله می‌گردند. اثر دما بر تثبیت نیتروژن در لگوم‌ها تا حدود زیادی تابع شرایط عمومی محیط بوده، بهترین دمای برای فعالیت ریزوبیوم‌ها در مناطق معتدله $20\text{--}25^{\circ}\text{C}$ و در مناطق گرمسیری $35\text{--}45^{\circ}\text{C}$ می‌باشد (حیدری شریف آباد و ترک نژاد، ۱۳۷۹). حرارت کمتر از ۳ درجه سانتی‌گراد خاک سبب توقف فعالیت باکتری‌ها می‌شود. به علاوه باعث تاخیر نفوذ باکتری به ریشه گیاه و کاهش فعالیت نیتروژناز می‌گردد. حرارت 20 تا 30 درجه سانتی‌گراد برای فعالیت باکتری‌های ریزوبیوم مناسب است (کلارسون و رسول، ۱۹۷۹).

اولین اثر دماهای پایین بر گیاهان کاهش در سرعت رشد و متابولیسم می‌باشد. دمای پایین رشد گیاهان تثبیت کننده نیتروژن را بیشتر از گیاهانی که از ترکیبات نیتروژن دار استفاده کرده محدود می‌کند (لیندمن و هام، ۱۹۷۹؛ لگروس و اسمیت، ۱۹۹۴). در دمای کم، نیتروژن بیشتر از کربن رشد را محدود می‌نماید (توماس و سپریت، ۱۹۸۴). مطالعه تاثیر دمای منطقه ریشه پایین‌تر از حد مطلوب بر روی تثبیت نیتروژن در سویا و سایر لگوم‌های علوفه‌ای نیمه گرمسیری مشخص نمود که دمای پایین سبب کاهش گره‌زایی، کاهش فعالیت و کارائی آن‌ها می‌شود (روگلی و داتا، ۱۹۸۶؛ لینچ و اسمیت، ۱۹۹۳الف؛ لگروس و اسمیت، ۱۹۹۴).

پیشرفت مراحل آلوگری و ایجاد برآمدگی‌های اولیه گره‌ها روی ریشه سویا بیشترین حساسیت را نسبت به دمای پایین منطقه ریشه نشان داده‌اند (لینچ و اسمیت، ۱۹۹۳؛ زانگ و اسمیت، ۱۹۹۴). تمام مراحل شکل‌گیری و عملکرد گره، تحت تاثیر کاهش دمای منطقه ریشه می‌باشد (لی، ۱۹۸۱). آزمایش‌ها نشان داده‌اند که انتقال لگوم‌ها در مراحل مختلف چرخه‌ی زندگی‌شان از دمای مناسب به دمای پایین‌تر منطقه ریشه، توسعه گره در تمام مراحل را با حساسیت بیش‌تری نشان دادند (لیندمن و هام، ۱۹۷۹؛ ماتوز و هایز، ۱۹۸۲؛ لینچ و اسمیت، ۱۹۹۳). طبق

کاهش دمای منطقه ریشه تاثیر شدیداً کاهنده‌ای بر روی رشد و نمو و عملکرد ارقام یونجه یکساله مقاوم به سرما داشته است (امینی و همکاران، ۱۳۸۲ب). به منظور بهره‌برداری حداکثر از اولین باران‌های پاییز و در عین حال امکان بهره‌برداری از تمام فصل رویشی در مناطقی با زمستان‌های معتدل، مانند خوزستان، بوشهر و گرگان باید کشت بلافضله پس از نزول اولین بارندگی مطمئن پاییزی انجام شود. اگر خطر سرمازدگی وجود نداشته باشد کشت پاییزی موفق‌تر از کشت بهاری خواهد بود (پیله وری و حسینی عراقی، ۱۳۵۹). در چنین شرایطی کشت زود پاییزی نتیجه بهتری می‌دهد، چرا که بذرها سریع‌تر جوانه زده و به دلیل وجود گرمای بیش‌تر، سریع‌تر رشد کرده و ریشه خود را در خاک مستقر می‌کنند و در برابر سرمای زمستان از مقاومت بیش‌تری برخوردار هستند (خلیلی، ۱۳۷۰). در مناطقی که خطر یخ‌بندان زمستان وجود دارد مانند بسیاری از نقاط سردسیر شمال شرق و غرب کشور، کشت پاییزی موفقیت آمیز نبوده و بوته‌ها در اثر سرمای زمستان از بین می‌رونند (میرنژاد، ۱۳۷۶).

زمان کاشت در یونجه‌های یکساله حتی هنگامی که به صورت مخلوط کاشته شوند در عملکرد یونجه یکساله تاثیر زیادی دارد. به طوری که کاشت زودتر این گونه‌ها موجب افزایش عملکرد آن‌ها می‌گردد. کاشت زودتر آن‌ها موجب افزایش طول دوره رشد شده و ماده‌ی خشک بیش‌تری در گیاه ذخیره می‌شود (جرانیامن و همکاران، ۱۹۹۸). از آنجا که دوره‌ی رشد یونجه‌های یکساله با فرا رسیدن فصل گرم به شدت کاهش یافته و محدود می‌گردد، کشت پاییزه و بهاره نسبت به کشت تابستانه آن‌ها، فرصت بیشتری را جهت فعالیت گیاه و ریزوبیوم‌های همزیست جهت تثبیت نیتروژن به گیاه می‌دهد. گزارش شده که در کشت بهاره چندین گونه یونجه یکساله با دوره رشد 60 روز بین 40 تا 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار تثبیت شده است. در حالی که در کشت تابستانه آن‌ها با دوره‌ی رشد 43 روز بین 20 تا 50 کیلوگرم نیتروژن در خاک تثبیت شده است (زهو و همکاران، ۱۹۹۸).

بررسی تاثیر تاریخ کاشت و غلظت‌های مختلف جنستین بر روی ثبیت نیتروژن ...

می‌گویند را فعال می‌کند (لونگ، ۱۹۸۹؛ پیترز و ورما، ۱۹۹۰).

مبادله سیگنال‌های مولکولی بین ریزوبیوم‌ها و گیاهان میزبان برای رشد گره در ریشه لگوم ضروری می‌باشد (ورما، ۱۹۹۲). ایزوفلاون دیادزین و جنستین اجزای اصلی عصاره‌ی ریشه سویا بوده که مسئول القاء ژن‌های گره برای ریزوبیوم می‌باشند (کوساک و همکاران، ۱۹۸۷). ایزوفلاون‌ها به عنوان یک ترکیب مهم در بافت خود و سویا مشخص شده‌اند (بارز و ولا، ۱۹۹۲). این ترکیبات مشخص به وسیله بخش‌هایی از تارهای کشنده ریشه ترشح شده که ناحیه‌ای با قابلیت بسیار بالا برای عفونت ریزوبیوم است (ورما، ۱۹۹۲). میزان فلاونوئیدها تاثیر مستقیمی بر گره‌زایی و ثبیت نیتروژن دارد (اپلاوم، ۱۹۹۰). این ترکیبات آزاد شدن کروموزم‌ها را در ریزوبیوم فعال کرده و باعث تحریک وتولید فاکتورهای باکتریایی می‌شود. این فاکتورها به عنوان لیپولیگوساکارید شناخته شده‌اند (لروگ و همکاران، ۱۹۹۰) که توانایی القاء بسیاری از مراحل اولیه در تکامل گره‌ها را دارا هستند (استیسی و همکاران، ۱۹۹۲) و شامل تغییر شکل و پیچش تارهای کشنده، شروع تقسیمات سلولی پوست ریشه و القاء گره می‌شوند (داناریا و روج، ۱۹۹۲). سرایت و فرایندهای تکامل گره‌های اولیه حساس‌ترین مراحل همزیستی می‌باشد (گیسون، ۱۹۷۱). حرارت‌های زیر حد معمول، سرایت تارهای کشنده ریشه را بیشتر از شروع گره‌زایی و تکامل گره و ثبیت نیتروژن به تاخیر می‌اندازد (لينچ و اسمیت، ۱۹۹۳؛ زانگ و اسمیت، ۱۹۹۴). سطح فلاونوئیدها در گیاهان میزبان همزیست میزان تحت تاثیر قرار گرفتن گره‌زایی لگوم‌ها و ثبیت مستقیم نیتروژن را نشان می‌دهد (اپلائوم، ۱۹۹۰). حرارت‌های کم از بیوسنتز جنستین در سویا جلوگیری می‌کند (زانگ و همکاران، ۱۹۹۶). که یکی از مهم‌ترین دلایل برای کاهش گره‌زایی و ایجاد تاخیر در آغاز ثبیت نیتروژن در دمای کم منطقه‌ی ریشه است. (زانگ و اسمیت، ۱۹۹۵). دماهای پایین منطقه‌ی ریشه، تجمع جنستین را در ریشه‌های سویا کاهش می‌دهد (زانگ و همکاران، ۱۹۹۶).

بررسی‌های انجام شده روی گیاهان مناطق معتدل نظری *T. glomeratum* و *Trifolium parviflorum* زمان تلقیح در دمای پایین منطقه ریشه طولانی‌تر می‌شود (کوماراسینگ و نوتمن، ۱۹۷۹). تحقیقات نشان می‌دهد گره‌هایی که در دمای زیر حد مناسب منطقه ریشه تشکیل شده‌اند کم بازده هستند (میلولون و ویلیامز، ۱۹۸۶).

دمای منطقه ریشه پایین‌تر از سطح مطلوب، تمام مراحل سرایت باکتری را کاهش داده و زمان بین تلقیح و پیچش تارهای کشنده را افزایش می‌دهد (زانگ و اسمیت، ۱۹۹۴). تاثیر دمای پایین منطقه ریشه روی ثبیت نیتروژن و سنتز NO_3 ممکن است بر روی انتقال مواد فتوسنتری نیز اثر بگذارد و در نتیجه فتوسنتر، فعالیت نیتروژن‌ناز را محدود کند (میلولون و ویلیامز، ۱۹۸۶). کاهش مشابهی در توسعه گره و تعداد گره در دمای پایین منطقه‌ی ریشه در *Vicia faba L.* مشاهده کرده‌اند (فیسون و سپرن، ۱۹۸۲). کاهش دمای منطقه ریشه موجب تاخیر در تلقیح، توسعه گره و جذب N_2 در همزیستی ریزوبیوم با لگوم‌ها می‌شود (گیسون، ۱۹۷۱). فرآیندهای نفوذ و سرایت و نیز فرآیندهای رشد سریع گره‌ها حساس‌ترین مراحل در مقابل دمای پایین منطقه‌ی ریشه می‌باشند. تمامی مراحل همزیستی ایجاد شده (پیچیدگی) - تارهای کشنده ریشه، عفونت‌های آلوده کننده، شکل گیری و نفوذ آن‌ها، رشد گره و عملکرد آن‌ها) نشان داده‌اند که تحت تاثیر دماهای پایین منطقه ریشه قرار گرفته و باز داشته می‌شوند، دماهای منطقه ریشه پایین‌تر از حد معمول عفونت تارهای کشنده را بیش‌تر از آغاز گره‌بندی، رشد گره‌ها و یا ترکیب نیتروژنی به تاخیر می‌اندازد (والش و لیزل، ۱۹۸۶). ثبیت همزیستی N_2 یک فرآیند پیچیده‌ای است که شامل جنبه‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی هر دو شریک همزیست می‌باشد. یکی از مراحل ابتدایی در فرآیند گره‌زایی شامل پیوستگی انتخابی و نیز نفوذ به ریشه گیاه توسط باکتری‌ها می‌باشد. اولین گام این مرحله احتمالاً پیام‌های مولکول‌های فلاونوئید که هم‌زیست باکتریایی را ممکن ساخته و یکسری از ژن‌های گره‌زایی باکتریایی که به آن‌ها ژنهای گره (node)

می تواند مبنای انتخاب گونه های سازگار با محیط باشدند (اهرمن و کوکس، ۱۹۹۰).

نتایج تحقیقات نشان داده است که گونه *M. rigidula* بیشترین پتانسیل زنده ماندن در زمستان را نسبت به گونه های *M. polymorpha* و *M. truncatula* دارد (کرال و همکاران، ۱۹۹۶). محققین دیگر دریافتند که در زمستان های خیلی سخت گونه *M. rigidula* نسبت به سایر گونه های یونجه یکساله مقاومت زیادتری نسبت به سرما نشان داده است (عبدالمونیم و کوکس، ۱۹۸۶؛ کوکس و اهرمن، ۱۹۸۷).

استفاده از گونه های یونجه یکساله سازگار با مناطق سرد و معتدل، با توجه به وجود دمای پایین هوا و خاک در اواخر فصل زمستان و اوایل بهار در دیمزارهای کشور، جایگزینی آن ها را در سال آیش در این مناطق با مشکل مواجه ساخته و موجب کاهش رشد و نمو و تولید علوفه و تثبیت نیتروژن می شود. برای رفع این معضل و انتخاب حایگزین مناسب در سال آیش، به گونه های مقاوم و سازگار به کاهش دمای هوا و خاک در اوایل فصل کشت نیاز می باشد، تا علاوه بر افزایش محصول غله و علوفه باعث افزایش حاصل خیزی خاک با افزایش تثبیت نیتروژن در دیمزارها گردد. لذا این پژوهش به منظور افزایش تثبیت نیتروژن و گره زایی جهت افزایش حاصل خیزی دیمزارها و مراعع و تولید علوفه لازم، انجام گرفت.

مواد و روش ها

این آزمایش در شرایط مزرعه ای در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس واقع در پیکان شهر کرج انجام گرفت. در این آزمایش از سه گونه یونجه یکساله *M. polymorpha* cv. Santiago و *M. rigidula* cv. Radiata که با مناطق سرد و معتدل سازگاری دارند استفاده شد. تاریخ کشت در سه سطح اول و دهم و بیستم اسفند ماه به عنوان کرت های اصلی و گونه های یونجه یکساله به عنوان کرت های فرعی و محلول جنستین در دو سطح صفر و ۲۰ میکرو مول در لیتر

یکی از عوامل مؤثر بر تثبیت نیتروژن در یونجه های یکساله گونه و رقم می باشد. به عبارت دیگر ارقام و گونه های مختلف یونجه یکساله توان متفاوتی در تشکیل گره بر روی ریشه و تثبیت نیتروژن دارند. مطالعه ای بر روی ۳۸ رقم یونجه یکساله نشان داد که در زمان ۰/۲ تا ۱۸/۴ میلی گرم در هر بوته بود که کمترین آن به گونه *M. polymorpha* و رقم SA-4408 و آن به گونه *M. Arabica* و رقم SA-2334 تعلق داشت (محمد و کamar، ۱۹۸۸).

تحمل در برابر سرمای گونه های *M. orbicularis* *M. rigidula* *M. polymorpha* و *M. rotata* مورد تأیید قرار گرفته است (اهرمن و کوکس، ۱۹۸۷). گیاهچه های گونه *Medicago truncatula* در شرایط دمای ۲-۵ درجه سانتی گراد به مدت یک هفته صدمه دیده و از بین رفتند (حیدری شریف آبادی، ۱۳۸۱). گونه *Medicago radiata* می تواند زمستان را با دوره یخنداش بدون آسیب پذیری سپری کند. احتمالاً گیاهچه های گونه *Medicago rigidula* نیز *Medicago rotata* و *Medicago polymorpha* مانند *Medicago truncatula* و *Medicago tornata* نسبت به سرما حساسیت زیادی دارند (ترک نژاد، ۱۳۷۸).

گونه *Medicago Polymorpha* نسبت به سایر یونجه های یکساله بیشترین سطح پراکنش را در ایران دارد و در ارتفاع کمتر از ۲۰۰۰ متر در انواع خاک ها دیده می شود (سنگل و ملک پور، ۱۳۷۳). گونه *Medicago polymorpha* دارای گستردگی پراکنش است (اهرمن و کوکس، ۱۹۹۰). گونه *Medicago radiata* محدود به مناطق سرد بوده (کوکس و اهرمن، ۱۹۸۷) و بعضی از گونه های یونجه یکساله مثل *Medicago noeana* و *Medicago rigidula* در مناطق سرد ترکیه و ایران یافت می شوند (کوکس، ۱۹۹۲). حضور و فراوانی یونجه های یکساله در هر محیط

نمی‌باشند. بنابراین بررسی نتایج بر اساس تجزیه مرکب داده‌ها انجام گرفت.

اثرات اصلی سال، ارقام یونجه یکساله، تاریخ کشت و غلظت‌های مختلف جنستین و همچنین اثرات متقابل مرتبه‌ی اول، ارقام \times تاریخ کشت، تاریخ \times جنستین، ارقام \times جنستین و مرتبه دوم ارقام \times تاریخ کشت \times جنستین در سطح یک درصد بر روی اکثر صفات مورد بررسی تاثیر معنی‌داری داشته، اما اثرات متقابل مرتبه‌ی سوم در اکثر صفات مورد بررسی تاثیر معنی‌داری نداشته‌اند. با توجه به معنی‌دار شدن اثرات اصلی و متقابل مرتبه‌ی اول از ذکر آن‌ها خودداری شده و اثرات متقابل مرتبه‌ی دوم توضیح داده می‌شود.

حداکثر میزان ماده‌ی خشک گره در گونه‌ی *M. polymorpha* در تاریخ کشت سوم و غلظت ۲۰ میکرومول در لیتر جنستین ($60/3$ میلی‌گرم در هر گیاه) و کمترین آن ($1/3$ میلی‌گرم در هر گیاه) در گونه‌ی *M. radiata* در تاریخ کشت دوم و در غلظت صفر میکرو مول در لیتر جنستین حاصل گردید (جدول ۱). نتایج حاصل با نتایج سایر پژوهش‌گران در رابطه با تاثیر افزایشی جنستین بر روی مقدار ماده خشک گره مشابه می‌باشد. استفاده از جنستین تعداد گره و مقدار ماده هنوز سرد است جلو می‌اندازد درجه حرارت پایین، از بیوسترنز جنستین در گیاهان سویا جلوگیری می‌کند (زانگ و همکاران، ۱۹۹۶). در درجه حرارت کم منطقه‌ی (زانگ و همکاران، ۱۹۹۶) در تاریخ کشت دار نیاز دارد. تحت این شرایط مداومت تلچیح گیاه با جنستین، ممکن است بر تاثیرات منفی ناشی از درجه حرارت بروی گره‌زدایی و ثبیت نیتروژن غلبه کند (اسمیت و زانگ، ۱۹۹۴؛ اسمیت و زانگ، ۱۹۹۵).

ماکریم تعداد گره در ریشه به ترتیب با $139/7$ و $139/1$ گره در گونه‌ی *M. polymorpha* در غلظت ۲۰ میکرومول در لیتر جنستین و در تاریخ کشت‌های سوم و *M. radiata* در تاریخ کشت دوم و در غلظت صفر میکرو مول در لیتر جنستین حاصل شد (جدول ۱). نتایج حاکی از تاثیر

(امینی‌دهقی و همکاران، ۱۳۸۵) در کرت‌های فرعی فرعی با ابعاد 2×2 متر اعمال شد. آزمایش در قالب طرح اسپلیت اسپلیت پلات بر پایه‌ی بلوک‌های کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. کشت به صورت خطی و با فاصله پنجاه سانتی‌متر از یکدیگر انجام گرفت.

جهت تلقیح گیاهان از باکتری *Rhizobium meliloti* که در محیط کشت استریل بدون آگار کشت داده شده بود استفاده گردید (امینی‌دهقی و همکاران، ۱۳۸۲الف). قبل از کاشت، بذور با باکتری و جنستین تلقیح شدند. جنستین $7,5,4\text{--}7,5,4$ Trihydroxyisoflavan (Acros, New Jersey USA در لیتر به سوسپانسیون ضد عفونی شده باکتری اضافه گردید. تلچیح بذرها در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸ ساعت انجام شد (هالورسون و استیسی، ۱۹۸۴). همچنین محلول ۲۰ میکرومول در لیتر جنستین همراه با آب مقطمر روی بذور کشت شده در داخل شیارها پاشیده شد (زانگ و همکاران، ۱۹۹۶).

در مرحله 0.50% گلدهی نمونه‌برداری در سطح $0/5$ مترمربع از کرت‌های آزمایشی انجام گردید. عواملی که در این آزمایش مورد بررسی و اندازه‌گیری قرار گرفتند عبارتند از: میزان ماده‌ی خشک ریشه و گیاه، میزان ماده‌ی خشک گره ریشه (در دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد و به مدت ۴۸ ساعت در اون)، تعداد گره در ریشه، تعداد گره در هر کلون، تعداد دسته گره در ریشه، طول و قطر دسته گره، طول و قطر گره (با کولیس)، طول پراکنش گره در ریشه، درصد و مقدار نیتروژن گیاه (با استفاده از دستگاه اتوکجلدال). تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم‌افزار SAS انجام گرفت (انستیتو ساس، ۱۹۹۷) و مقایسه میانگین‌ها توسط آزمون دانکن در سطح ۵ درصد (استل و توریبی، ۱۹۸۰) صورت پذیرفت.

نتایج

در ابتدا به دلیل معنی‌دار شدن عامل سال در تعدادی از صفات اندازه‌گیری شده، با استفاده از واریانس خطای آزمایشی صفات مذکور در دو سال آزمایش، آزمون F به عمل آمده و نتیجه گرفته شد که در اکثر آن‌ها F محاسبه شده از F جدول کمتر بوده و معنی‌دار

۲۰ میکرومول در لیتر جنستین و حداقل تعداد دسته گره (۱/۴ و ۱/۳ عدد) در گونه *M. radiata* در تاریخ کشت دوم و در غلظت‌های صفر و ۲۰ میکرومول در لیتر جنستین به دست آمد (جدول ۱). جنستین تولید لیپو الیگوساکارید را تحریک کرده و فاصله زمانی بین تلقیح و پیچیدگی تارهای کشنده‌ی ریشه را یک تا دو روز کوتاه‌تر کرد (زانگ و اسمیت، ۱۹۹۵). جنستین می‌تواند سرعت آسودگی *B. japonicum* را افزایش داده و در نتیجه گرهدار شدن و ثبت نیتروژن N_2 را زیاد می‌کند. تمامی مراحل هم‌زیستی در طول زمان (پیچیدگی تارهای کشنده‌ی ریشه، ایجاد آسودگی‌ها، شکل‌گیری و نفوذ آن‌ها، رشد گره و عملکرد آن‌ها) نشان داده‌اند که توسط دماهای پایین‌تر از حد معمول منطقه‌ی ریشه باز داشته می‌شوند (زانگ و همکاران، ۱۹۹۶).

بیشترین تعداد گره در طول ریشه در گونه *M. polymorpha* در تاریخ کشت سوم و در غلظت ۲۰ میکرومول در لیتر جنستین و کمترین تعداد گره در طول ریشه در گونه *M. radiata* در تاریخ کشت دوم و در غلظت‌های ۲۰ و صفر میکرومول در لیتر جنستین مشاهده شد (جدول ۱). دمای منطقه‌ی ریشه پایین‌تر از حد مطلوب (کمتر از ۵ درجه سانتی‌گراد) (امینی‌دهقی و همکاران، ۱۳۸۲الف)، همه مراحل آسودگی را به تاخیر می‌اندازد (زانگ و اسمیت، ۱۹۹۴). کاربرد جنستین تعداد گره و ماده خشک گره را به ازای هرگیاه افزایش داد و زمان آغاز ثبت نیتروژن را به خصوص برای گیاهان سویای کشت زود هنگام به جلو انداخت (زانگ و همکاران، ۱۹۹۶). مداومت تلقیح گیاه با جنستین ممکن است بر تاثیرات منفی ناشی از درجه حرارت پایین بر روی گره‌زدایی و ثبت نیتروژن غلبه کند (زانگ و همکاران، ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶). کاهش حساسیت *B. japonicum* به سیگنال‌ها در دماهای پایین یکی دیگر از دلایل مهم تأخیر در گره‌زایی است. بنابراین درجه حرارت‌های پایین از بیوسنتز جنستین در بافت سویا جلوگیری کرده و هم حساسیت *B. japonicum* نسبت به علامت‌های فلانوئید را کاهش می‌دهد (زانگ و همکاران، ۱۹۹۶).

دمای مناسب محیط و جنستین در افزایش گره‌زایی و توسعه گره‌ها می‌باشد. استفاده از جنستین در دوره پیش از جوانه زنی یا کاربرد مستقیم جنستین، بر روی محیط ریشه گیاه، گره‌زایی و ثبت نیتروژن سویا را افزایش داد (زانگ و همکاران، ۱۹۹۶). سطح فلاونین‌ها تاثیر مستقیم بر گره‌زایی و ثبت نیتروژن داشته و سطح فلاونوئید در گیاهان میزبان هم‌زیست میزان تحت تاثیر قرار گرفتن گره‌زایی لگوم‌ها و ثبت مستقیم نیتروژن را نشان می‌دهد (آپلباوم، ۱۹۹۰). تمام مراحل استقرار ریزوپیوم (موجدار شدن ریشه‌های مویی، عبور از مرحله سرایت به مرحله شکل‌گیری و نفوذ، توسعه گره و عملکرد آن) به وسیله حرارت‌های پایین‌تر از معمول بازداشت می‌شوند (لیندرمن و هام، ۱۹۷۹؛ لینچ و اسمیت، ۱۹۹۳؛ هایز و ماتوز، ۱۹۸۲). ایجاد آسودگی و توسعه‌ی سریع گره‌ها از حساس‌ترین مراحل چرخه ایجاد هم‌زیستی است (زانگ و اسمیت، ۱۹۹۵). بنابراین فرآیندهای آسودگی و ایجاد گره بسیار حساس و تحریک پذیر است (زانگ و اسمیت، ۱۹۹۴). جنستین در محیط‌های استریل تعداد گره را به ازاء هرگیاه افزایش داد که این امر ممکن است به افزایش در تعداد آسودگی‌ها و یا افزایش در مقدار آسودگی‌هایی که منجر به تشکیل گره شده مربوط باشد، فرآیندهای نفوذ، سرایت و نیز رشد سریع گره‌ها حساس‌ترین مراحل در مقابل دمای پایین‌تر از حد معمول منطقه‌ی ریشه می‌باشند (زانگ و همکاران، ۱۹۹۶).

بیشترین تعداد گره در هر کلون (۴/۲) در گونه *M. polymorpha* و در تاریخ کشت سوم و در غلظت ۲۰ میکرومول در لیتر جنستین و کمترین تعداد گره در هر کلون (۱/۶) در گونه *M. rigidula* در تاریخ کشت دوم در غلظت صفر میکرومول در لیتر جنستین مشاهده گردید (جدول ۱)، که حاکی از تاثیر دما بر روی رشد و توسعه گره‌ها می‌باشد. تمام مراحل استقرار ریزوپیوم، به وسیله حرارت‌های پایین‌تر از مطلوب جلوگیری می‌شوند (لیندرمن و هام، ۱۹۷۹؛ لینچ و اسمیت، ۱۹۹۳؛ هایز و ماتوز، ۱۹۸۲).

حداکثر تعداد دسته گره در ریشه (۱۰/۲ عدد) در گونه *M. polymorpha* در تاریخ کشت سوم و غلظت

نیتروژن و سنتز NO_3^- ممکن است به دلیل اثر بر فتوسنتز و انتقال مواد باشد (میلهولون و ویلیامز، ۱۹۸۶). این امر با اثر محدود کننده فتوسنتزی برفعالیت آنزیم نیتروژنаз ثابت شده است (سولگر و همکاران، ۱۹۷۵). کاهش درجه حرارت منطقه ریشه، اثر معکوس و شدیدی برروی گره‌زایی لگومها و تثبیت نیتروژن می‌گذارد (هاردی و همکاران، ۱۹۶۸؛ روگلی و دانا، ۱۹۸۶؛ لینچ و اسمیت، ۱۹۹۴). مطالعات آثار درجه حرارت‌های پایین‌تر از حد معمول منطقه ریشه بر روی سویا نشان داده‌اند که این شرایط فعالیت تثبیت N_2 را با کاهش مستقیم فعالیت آنزیم‌های پیچیده و مرکب تثبیت نیتروژن، کاهش می‌دهند و نیز با ممانعت ساختن و یا با به تأخیر انداختن عفونت ریشه و گره‌سازی این فعالیت را کاهش می‌دهند (والش و لایزل، ۱۹۸۶).

بیشترین قطر گره در گونه *M. polymorpha* در تاریخ کشت سوم و غلظت ۲۰ میکرومول جنسین و کمترین قطر گره در گونه‌های *M. radiata* در تاریخ کشت دوم و در غلظت‌های ۲۰ و صفر میکرومول در لیتر جنسین به دست آمد. کاهش درجه حرارت منطقه ریشه، اثر معکوس و شدیدی برروی گره‌زایی و تثبیت نیتروژن لگومها می‌گذارد (جونز و تیزدل، ۱۹۲۱؛ هاردی و همکاران، ۱۹۶۸؛ روگلی و دانا، ۱۹۸۶؛ لینچ اسمیت، ۱۹۹۴). تمام مراحل زندگی همزیست (پیچیدگی ریشه‌های مؤین، رشته‌های آلوده، توسعه گره‌ها و عملکرد آن‌ها) به‌وسیله کمترین دمای منطقه ریشه محدود می‌شود (لیندرمن و هم، ۱۹۷۹؛ ماتوس و هایز، ۱۹۸۲؛ لینچ و اسمیت، ۱۹۹۳).

بیشترین قطر دسته گره ریشه با $4/3$ میلی‌متر متعلق به گونه *M. polymorpha* در غلظت صفر میکرومول جنسین و کمترین قطر دسته گره را با $1/4$ میلی‌متر در گونه *M. radiata* و در غلظت‌های صفر و ۲۰ میکرومول جنسین دارا بودند. بیشترین طول و قطر دسته گره در گونه *M. polymorpha* در تاریخ کشت اول و در غلظت ۲۰ میکرومول جنسین و کمترین طول و قطر دسته گره در گونه *M. radiata* در تاریخ کشت دوم و در غلظت صفر میکرومول جنسین مشاهده شد. استفاده از جنسین سرعت تشکیل گره را در دمای

بیشترین درصد و مقدار نیتروژن گیاه در گونه *M. rigidula* در تاریخ کشت دوم در غلظت‌های صفر و ۲۰ میکرومول بر لیتر جنسین و نیز در تاریخ کشت سوم در غلظت صفر میکرومول بر لیتر جنسین و گونه *M. radiata* در تاریخ کشت‌های دوم و سوم در غلظت ۲۰ میکرومول بر لیتر جنسین و نیز در تاریخ کشت سوم در غلظت صفر میکرومول بر لیتر جنسین و کمترین درصد و مقدار نیتروژن گیاه در گونه *M. polymorpha* در تاریخ کشت اول در غلظت‌های ۲۰ و صفر میکرومول بر لیتر جنسین و نیز در تاریخ کشت دوم و در غلظت صفر میکرومول بر لیتر جنسین حاصل شده است (جدول ۲). نتایج حاصله نشان می‌دهند که در دمای مناسب (بیشتر از 10°C) استفاده از جنسین تاثیر زیادی در افزایش گره‌زایی و تثبیت نیتروژن نداشته و گونه‌های یونجه یک‌ساله عکس‌العملی به مصرف آن نشان نمی‌دهند. اما در دمای پایین (کمتر از 5°C درجه سانتی‌گراد) موجب افزایش گره‌زایی در گونه‌ها شده و بر روی میزان و درصد نیتروژن تثبیت شده اثر مثبت و فزاینده‌ای داشته است. کاربرد جستین در سویا منجر به افزایش ۲ تا 4°C روزه در مدت زمان تثبیت نیتروژن شد و کل نیتروژن تثبیت شده تقریباً 40% افزایش یافت. به نظر می‌رسد که مقداری از این افزایش تثبیت نیتروژن تحت شرایط فصلی کوتاه، به‌دلیل افزایش در تعداد گره در مراحل اولیه‌ی رشد رویشی بوده است (زانگ و اسمیت، ۱۹۹۵). کارایی و تعداد بیشتر گره‌ها که در نتیجه کاربرد جنسین حاصل شده، به‌وسیله درجه حرارت محدود نشده و نیتروژن تثبیت شده کل و عملکرد نیتروژن گیاهانی که با *B. japonicum* و جنسین در دوره قبل از جوانه‌زنی تیمار شده بیشتر از آن‌ها بی‌بود که به‌طور منظم، ماده‌ی تلقیحی باکتری را دریافت کرده بودند (زانگ و اسمیت، ۱۹۹۵). گزارش شده که افزایش ده درصد در دوره‌ی فعالیت گره یک لگوم دانه‌ای، خصوصاً در فاصله زمانی بین آغاز تثبیت نیتروژن و رسیدن به حداقل مقدار تثبیت، می‌تواند میزان نیتروژن تثبیت شده‌ی فصلی را دو برابر کند (سپرنت، ۱۹۷۹). گزارش کردند که اثر درجه حرارت پایین بر تثبیت

افزایش رشد و نمو آن گشته و ماده‌ی خشک بیشتری برای رشد ریشه‌ها مهیا گردیده، که در نتیجه، موجب افزایش وزن و طول ریشه گیاه شده است. دمای منطقه ریشه پایین‌تر از حد مطلوب، همه مراحل آلوودگی را به تاخیر می‌اندازد (زانگ و اسمیت، ۱۹۹۴). تمام مراحل استقرار ریزوپویوم (موجدارشدن ریشه‌های مؤین، نفوذ و ایجاد مرحله شکل‌گیری آلوودگی، توسعه گره و عملکرد آن) به وسیله حرارت‌های پایین‌تر از معمول بازداشته می‌شوند (ليندرمن و هام، ۱۹۷۹؛ لینچ واسمیت، ۱۹۹۳؛ هایز و ماتوز، ۱۹۸۲).

بیشترین میزان ماده‌ی خشک گیاه در گونه‌های *M. radiata* و *M. rigidula* در تاریخ کشت سوم و غلظت ۲۰ میکرومول در لیتر جنستین به ترتیب با ۱۲۰۳۰ و ۱۱۳۲۵ میلی‌گرم در هر گیاه و کمترین آن به ترتیب با ۲۵۳۸، ۱۹۲۵ و ۱۵۲۵ میلی‌گرم در هر گیاه در گونه *M. polymorpha* در تاریخ کشت دوم با غلظت صفر میکرومول در لیتر جنستین و در تاریخ کشت اول در غلظت‌های ۲۰ و صفر میکرومول در لیتر جنستین حاصل شد (جدول ۱). دماهای پایین در تاریخ کشت اول (کمتر از ۵ درجه سانتی‌گراد)، باعث کاهش تثبیت نیتروژن و فتوسنتر شده و موجب کاهش میزان ماده‌ی خشک تولیدی در هر گیاه شده است (امینی-دهقی و همکاران، ۱۳۸۵). اولین اثر دماهای پایین بر روی گیاهان، کاهش در سرعت فرآیند رشد و متابولیسم می‌باشد. گزارش شده که اثر درجه حرارت پایین بر روی تثبیت نیتروژن، ممکن است به دلیل اثر بر فتوسنتر و انتقال مواد باشد که این امر از محدودیت فتوسنتری در فعالیت نیتروژنانز ثابت شده است (سلوگ و همکاران، ۱۹۷۵). ممکن است دمای پایین‌تر از مطلوب منطقه ریشه، سرعت خروج نیتروژن تثبیت شده را از گره‌ها محدود کرده باشد (میلهویون و ویلیامز، ۱۹۸۶)، درنتیجه فعالیت نیتروژنانز کاهش یافت است (سپرنت و سپرنت، ۱۹۹۰) گزارش کرده‌اند که اثر درجه حرارت پایین بر روی تثبیت نیتروژن و سنتز NO_3^- ممکن است به دلیل اثر بر روی فتوسنتر و انتقال مواد باشد (میلهویون و ویلیامز، ۱۹۸۶).

پایین افزایش داده (کمتر از ۵ درجه سانتی‌گراد)، لذا گره‌ها زودتر تشکیل شده و رشد بیشتری نموده و فعال‌تر هستند. جنستین تعداد گره‌ها در دمای پایین منطقه ریشه (کمتر از ۵ درجه سانتی‌گراد) را افزایش می‌دهد و با افزایش دمای خاک تاثیر آن بر تعداد گره و تثبیت نیتروژن کاهش یافت (امینی‌دهقی و همکاران، ۱۳۸۵). جنستین افروده شده تولید لیپوالیگوساکارید را تحریک کرده و دوره زمانی بین تلقیح و پیچیدگی تارهای کشنده‌ی ریشه، را یک تا دو روز کوتاه‌تر نمود (زانگ واسمیت، ۱۹۹۵).

بیشترین میزان ماده‌ی خشک ریشه با ۳۳۹ میلی‌گرم در هر بوته در گونه *M. radiata* در تاریخ کشت سوم و غلظت ۲۰ میکرومول بر لیتر جنستین و کمترین میزان ماده‌ی خشک ریشه با ۵۴ میلی‌گرم در گونه *M. polymorpha* در تاریخ کشت اول و غلظت صفر میکرومول بر لیتر جنستین مشاهده شد (جدول ۱). در تاریخ کشت اول با کاهش دما، میزان گره‌زایی و تثبیت نیتروژن کاهش یافته و ماده‌ی خشک کمتری سنتز و به ریشه انتقال پیدا نموده، اما در دمای بالاتر و مصرف جنستین، موجب تحریک گره‌زایی و افزایش غلاظت نیتروژن گردیده و رشد و نمو گیاه فعال‌تر شده و ماده‌ی خشک بیشتری ساخته و به بخش‌های مختلف گیاه از جمله ریشه‌ها اختصاص داده است. سطح فلاونوئیدها تاثیر مستقیم بر گره‌زایی و تثبیت نیتروژن دارند (آپلائوم، ۱۹۹۰). کاهش درجه حرارت منطقه ریشه، اثر معکوس و شدیدی بر روی گره‌زایی لگومها و تثبیت نیتروژن می‌گذارد (هارددی و همکاران، ۱۹۶۸؛ روگلی و دانا، ۱۹۸۶؛ لینچ واسمیت، ۱۹۹۴).

حداکثر طول ریشه با ۲۷ سانتی‌متر در گونه *M. radiata* در تاریخ کشت سوم و در غلظت ۲۰ میکرومول بر لیتر جنستین و کمترین آن به ترتیب با ۱۹ و ۱۹ سانتی‌متر در گونه *M. polymorpha* در تاریخ کشت سوم و غلظت‌های صفر و ۲۰ میکرومول بر لیتر جنستین حاصل شد (جدول ۲). با افزایش دما گره‌زایی تسريع شده و تثبیت نیتروژن بیش‌تر شده لذا نیتروژن زیادتری در اختیار گیاه قرار گرفته و باعث

جدول ۲: مقایسه‌ی میانگین‌های اثرات متقابل جنسنیتین و تاریخ کاشت و گونه بر صفات مختلف گونه‌های یونجه یکساله در دو سال

طول ریشه (cm)			مقدار نیتروژن گونه‌ها (mg/g)			جنسنیتین μmol/lit	گونه		
تاریخ کاشت			تاریخ کاشت						
سوم	دوم	اول	سوم	دوم	اول				
۱۹/۱ f	۲۵/۳ ab	۲۲/۱ bcdef	۳۲/۳ de	۳۲/۱ de	۳۱/۶ ef	۲۰	<i>M. polymorpha</i>		
۲۷/۰ a	۲۴/۵ ab	۲۰/۲ def	۳۴/۱ ab	۳۴/۱ ab	۳۳/۰ cd	۲۰	<i>M. radiate</i>		
۲۲/۳ bcd	۲۲/۵ bcd	۲۰/۵ def	۳۲ cd	۳۴/۱ ab	۳۲/۳ de	۲۰	<i>M. rigidula</i>		
۱۹/۹ ef	۲۴/۰ abc	۲۰/۱ ef	۳۱/۹ ef	۳۱/۷ ef	۳۱/۱ f	.	<i>M. polymorpha</i>		
۲۰/۸ cdef	۲۱/۱ cdef	۲۰/۷ def	۳۳/۹ abc	۳۳/۸ bc	۳۲/۴ de	.	<i>M. radiata</i>		
۲۲/۶ bcde	۲۴/۳ ab	۲۳/۴ bcd	۳۴/۵ ab	۳۴/۹ a	۳۲/۲ de	.	<i>M. rigidula</i>		

اعداد با حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون اختلاف معنی دار ندارند.

ایجاد تاخیر در آغاز تثبیت نیتروژن در دمای کم منطقه ریشه است (زانگ واسمیت، ۱۹۹۵؛ عزیزی و همکاران، ۲۰۰۴).

استفاده از جنسنیتین (۲۰ میکرومول در لیتر) در مقایسه با شاهد (صفر میکرومول در لیتر) تاثیر افزاینده‌ای بر روی گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در گونه‌های یونجه یکساله داشته است (امینی‌دهقی و همکاران، ۱۳۸۵). که حاکی از اثر تعدیل کندگی جنسنیتین و کاهش تاثیر منفی دمای پایین محیط بر روی گره‌زایی و تثبیت نیتروژن یونجه یکساله می‌باشد. اثبات شده است که در شرایط دمایی پایین دوران کمون منجر به کاهش مدت زمان سپری شده قبل از مراحل اولیه موجدار شدن ریشه‌های موئی و آغاز تثبیت نیتروژن و افزایش مقدار کل نیتروژن تثبیت شده در هر گیاه می‌شود (زانگ واسمیت، ۱۹۹۵؛ زانگ وهمکاران، ۱۹۹۶).

بررسی اثرات متقابل تیمارهای اعمال شده، نشان داد که استفاده از جنسنیتین در تاریخ کشت اول در تمام گونه‌های مورد بررسی باعث افزایش گره‌زایی و تثبیت نیتروژن شده، که این امر مovid تاثیر جنسنیتین در ایجاد مقاومت به سرما، برای بهبود گره‌زایی و تثبیت نیتروژن گونه‌های یونجه یکساله در شرایط مزرعه می‌باشد (امینی دهقی و همکاران، ۱۳۸۵، نتایج حاصل با نتایج سایر پژوهش‌گران در رابطه با تاثیر افزایشی جنسنیتین بر روی گره‌زایی و تثبیت نیتروژن مشابه است. استفاده از

بحث و نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج به دست آمده مشخص می‌گردد: در سال اول با توجه به مناسب‌تر بودن شرایط دمایی در آغاز فصل رشد، گونه‌های یونجه یکساله رشد و نمو، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن بهتر و بیشتری نسبت به سال دوم که در ابتدای فصل رشد دمای نامناسب در مدت طولانی‌تری حاکم بوده، داشته است.

ارقام از لحاظ تثبیت نیتروژن و گره‌زایی و سایر صفات مورد بررسی تفاوت معنی داری داشته و گونه M. polymorpha نسبت به گونه‌های دیگر از نظر میزان تثبیت نیتروژن و گره‌زایی، میزان ماده‌ی خشک ریشه و درصد نیتروژن برتر بوده و توانایی بیشتری در تثبیت نیتروژن دارا است. افزایش تعداد و سطح برگ در اثر استعمال جنسنیتین، باعث گسترش سطح فتوسنترز کننده گیاه در شرایط تنفس دمای پایین منطقه ریشه شده و ماده خشک بیشتری در گیاه ساخته و به بخش‌های مختلف گیاه نظیر ریشه، برگ و ساقه اختصاص می‌یابد (امینی‌دهقی و همکاران، الف، ۱۳۸۲؛ امینی‌دهقی و مدرس ثانوی، ۲۰۰۳؛ عزیزی و همکاران، ۲۰۰۴).

در تاریخ کشت سوم با مطلوب‌تر شدن دمای هوا و خاک، بیشترین مقدار گره‌زایی و تثبیت نیتروژن، در گونه‌های یونجه یکساله مشاهده گردید اما در تاریخ کشت اول به دلیل تاثیر دمای پایین هوا و خاک بر روی رشد و نمو، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن، کمترین میزان گره‌زایی و تثبیت نیتروژن را گونه‌های یونجه یکساله داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل برای کاهش گره‌زایی،

همکاران، ۱۹۶۸؛ روگهلهی و داتا، ۱۹۸۶؛ لینچ واسمیت، ۱۹۹۵.)

در تاریخ کشت‌های دوم و سوم با بهبود شرایط دمایی محیط و خاک، میزان گره‌زایی و ثبیت نیتروژن گونه‌های یونجه یکسانه نسبت به تاریخ کشت اول افزایش یافت. با این اوصاف در تاریخ کشت‌های دوم و سوم نیز به دلیل تغییرات شدید دمای هوا (fluctuation) که در ابتدای فصل رویش رخ می‌دهد رشد و نمو یونجه‌های یکسانه را با مشکل مواجهه ساخته است لذا گونه‌های یونجه یکسانه کشت شده در این تاریخ کشت‌ها هم به مصرف جنستین، عکس العمل مثبتی در جهت افزایش گره‌زایی و ثبیت نیتروژن، در شرایط زراعی نشان داده‌اند. برای تاثیر تحریک کنندگی جنستینی که مستقیماً بر روی خاک و یا بذر به کار رفته، در افزایش گره‌زایی و ثبیت نیتروژن یونجه‌های یکسانه در دمای پایین هوا و خاک، می‌توان گفت که کاهش بیوسنتز جنستین در شرایط دمای پایین در بافت گیاهان ممکن است به وسیله کاهش ارتباط فعالیت آنزیم در روند سنتز آن باشد (زانگ و همکاران، ۱۹۹۶).

گیاهانی که به دمای منطقه‌ی ریشه زیر حد مناسب منتقل شده، از سنتز جنستین و هم از برون تراوایی آن جلوگیری می‌کنند. اولین دلیل ممکن برای کاهش غلظت جنستین می‌تواند، کاهش برون تراوایی جنستینی از سلول‌های ریشه به محیط اطراف ریشه باشد (زانگ و همکاران، ۱۹۹۵). اختلال در سرعت برون تراوایی که با کاهش دما بوجود می‌آید، بیشتر از سرعت بیوسنتز جنستین است. در سطح غشاء هنگامی که سلول‌های گیاهان با قسمت‌های مجزا برای اولین بار با شرایط دمای پایین روبرو می‌شوند، انعطاف پذیری غشاء و عمل آن کاهش می‌یابد (زانگ و همکاران، ۱۹۹۶). انعطاف پذیری سطح غشاء در ابتدا به وسیله‌ی دمای منطقه ریشه زیر حد مناسب، کاهش می‌یابد و این منجر به کاهش سرعت برون تراوایی جنستین می‌گردد (زانگ و همکاران، ۱۹۹۶).

با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش می‌توان این گونه اظهار نظر نمود که:

جنستین تعداد گره و مقدار ماده خشک گره را در گیاه افزایش داده و زمان شروع ثبیت نیتروژن را در سویا در طول فصل رشد و زمانی که خاک هنوز سرد است جلو می‌اندازد. درجه حرارت پایین از بیوسنتز جنستین در گیاهان سویا جلوگیری می‌کند (زانگ و همکاران، ۱۹۹۶). نظر به این که در درجه حرارت کم منطقه ریشه جنستین بالاتری نیاز دارد. تحت این شرایط شاید، این غیر مترقبه نباشد که مداومت تلقيق جنستین گیاه، ممکن است بر تاثیرات منفی ناشی از درجه حرارت برروی گره‌زایی و ثبیت نیتروژن غلبه کند (زانگ واسمیت، ۱۹۹۴؛ زانگ واسمیت، ۱۹۹۵). استفاده از جنستین در دوره‌ی پیش از جوانه زنی یا کاربرد مستقیم جنستین، بر روی محیط ریشه گیاه، گره‌زایی و ثبیت نیتروژن سویا را افزایش داد (زانگ و همکاران، ۱۹۹۶). سطح فلاونوئیدها تاثیر مستقیم بر گره‌زایی و ثبیت نیتروژن داشته و در گیاهان میزبان هم‌زیست میزان تحت تاثیر قرار گرفتن گره‌زایی لگوم‌ها و ثبیت مستقیم نیتروژن را نشان می‌دهد (آپلیاوم، ۱۹۹۰). جنستین در محیط‌های استریل تعداد گره را به ازاء هر گیاه افزایش داد که این امر ممکن است به افزایش در تعداد آلودگی‌ها و یا افزایش در مقدار آلودگی‌هایی که منجر به تشکیل گره شده مربوط باشد (زانگ و همکاران، ۱۹۹۶؛ امینی دهقی و همکاران، ۱۳۸۵) کاربرد جستین در سویا منجر به افزایش ۲ تا ۴ روزه در مدت زمان ثبیت نیتروژن شد و کل نیتروژن ثبیت شده تقریباً ۴۰٪ افزایش یافت. به نظر می‌رسد که مقداری از این افزایش ثبیت نیتروژن تحت شرایط فصلی کوتاه، به دلیل افزایش در تعداد گره در مراحل اولیه رشد رویشی بوده است (زانگ واسمیت، ۱۹۹۵). گزارش شده ممکن است تاثیر درجه حرارت پایین بر روی ثبیت نیتروژن و سنتز NO_3^- به دلیل اثر آن بر فتوسنتز و انتقال مواد باشد (میلهولون و ویلیامز، ۱۹۸۶)، این امر با اثر محدود کننده‌ی فتوسنتزی بر فعالیت آنزیم نیتروژناز ثابت شده است (سلوگر و همکاران، ۱۹۷۵). کاهش درجه حرارت منطقه ریشه، اثر معکوس و شدیدی بر روی گره‌زایی لگوم‌ها و ثبیت نیتروژن می‌گذارد (جـ.نـز و تـیـزـدـالـ، ۱۹۲۱؛ هـارـدـیـ و

برای استفاده بهتر و بیشتر از ارقام پرمحصول، لازم است عواملی که منجر به کاهش رشد و نمو در دماهای نامناسب شده را شناسایی و در جهت بر طرف نمودن آنها گام برداشت. کاهش گرهزایی و تثبیت نیتروژن از مهم‌ترین عواملی است که منجر به کاهش رشد و نمو گیاهان تحت تنش سرما شده و حساسیت زیادتری نسبت به آنها در برابر سرما نشان می‌دهد (امینی‌دهقی و مدرس ثانوی، ۲۰۰۳؛ عزیزی و همکاران، ۲۰۰۴؛ امینی‌دهقی و همکاران، ۱۳۸۵). بنابراین اگر بتوان در جهت ایجاد هم‌زیستی موثر و گرهزایی و تثبیت نیتروژن در شرایط دمایی پایین اقدام نمود، قطعاً گامی موثر در جهت استفاده مطلوب‌تر از یونجه‌های یکساله در مناطق سرد و معتدل کشور برداشته می‌شود.

د- با توجه به نتایج آزمایش‌های انجام شده در شرایط کنترل شده (امینی‌دهقی و مدرس ثانوی، ۲۰۰۳؛ عزیزی و همکاران، ۲۰۰۴) و مزرعه‌ای، می‌توان از ارقام پرمحصول که مقاومت کمی به سرما دارند، نظیر گونه *M. polymorpha* برای کشت زودتر در مناطق سرد و معتدل‌له استفاده نمود و برای تقویت و تشدید گرهزایی و تثبیت نیتروژن در دماهای پایین می‌توان بذور آنها را قبل از کشت با جنستین تلقیح نمود که در این صورت آغاز آلوگی و گرهزایی و در نتیجه تثبیت نیتروژن در گیاه تسريع می‌شود و مقدار و درصد نیتروژن تثبیت شده افزایش یافته و باعث رشد و نمو بیشتر، افزایش عملکرد علوفه یونجه یکساله زود کشت شده می‌گردد. همچنین سبب حاصل‌خیزی دیمزارهای مناطق سرد و کوهستانی کشور شده و گامی موثر در اجرای سیستم لی فارمینگ و افزایش تولید گندم دیم و علوفه و کاهش تخریب مراتع و تحقق اهداف کشاورزی پایدار می‌باشد.

لذا استفاده از یونجه‌های یکساله در سیستم *Ley-farming* در مناطقی که در فصل رویش دمای هوا و خاک پایین بوده به شرط تلقیح آنها با جنستین، بسیار مناسب بوده زیرا رشد و تثبیت نیتروژن و گرهزایی مناسبی در صورت فراهم بودن سایر شرایط خواهند داشت. در این مناطق سیستم *Ley-farming* تناوبی غله- لگوم می‌تواند جایگزین مناسبی برای سیستم‌های تناوبی رایج غله- آیش باشد.

الف- کشت گونه‌های یونجه یکساله در شرایط دمائی و اقلیمی مناسب و مشابه، باعث افزایش گرهزایی و تثبیت نیتروژن شده و در نتیجه موجب استقرار بهتر گیاهچه، افزایش رشد و نمو، تولید علوفه‌ی بیشتر و افزایش حاصل‌خیزی دیمزارها و مراتع می‌گردد، که از این لحاظ گونه *M. polymorpha* نسبت به سایر گونه‌های مورد بررسی برتر بوده است (امینی‌دهقی و مدرس ثانوی، ۲۰۰۳؛ عزیزی و همکاران، ۲۰۰۴).

ب- با توجه به محدود بودن دوره رویشی یونجه‌های یکساله و این که افزایش دمای محیط باعث کوتاه شدن فاز رویشی و تسريع در رسیدن به فاز زایشی و تولید بذر و تکمیل چرخه زندگی گیاه می‌گردد لذا دوره رویشی و مدت زمان فعالیت تثبیت نیتروژن گیاه محدود گشته و تولید علوفه و نیز میزان تثبیت نیتروژن آن کاهش شدیدی می‌یابد (عزیزی و همکاران، ۲۰۰۴؛ امینی‌دهقی و همکاران، ۱۳۸۵). پس نمی‌توان از آنها در جهت تولید علوفه و اصلاح دیمزارها استفاده مناسبی نمود. برای استفاده از توانائی‌های بالقوه‌ی یونجه‌های یکساله، لازم است در جهت افزایش دوره رویشی آنها تلاش کرد. تنها راه ممکن، برای وصول به اهداف مذکور، کشت زودتر یونجه‌های یکساله می‌باشد که علاوه بر طولانی‌تر شدن دوره رویشی گیاه، از بارندگی‌های اول فصل استفاده بهتری برای تولید علوفه بیشتر و افزایش حاصل‌خیزی دیمزارها نماید لذا لازم است از گونه‌های مقاوم به سرما که امکان کشت زودتر آنها مقدور است، استفاده شود. با توجه به عدم مقاومت گونه‌های یونجه یکساله استرالیائی وارداتی به سرما، نیاز به شناسایی گونه‌های بومی مقاوم به سرما برای شرایط اقلیمی سرد و معتدل مناطق مستعد کشت یونجه یکساله در کشور می‌باشد. با توجه به نتایج حاصله در این آزمایش، گونه می‌باشد. با توجه به مقاومت یونجه‌ها می‌باشد. با توجه به نتایج حاصله در این آزمایش، گونه *M. rigidula* نسبت به سایر گونه‌ها مقاومت بیشتری به سرما نشان داده اما عملکرد علوفه و تثبیت نیتروژن کمتری از گونه *M. polymorpha* داشته است. پس می‌توان از گونه *M. rigidula* در شرایط دمایی نامناسب و پایین که رشد و نمو گونه *M. polymorpha* خوب نمی‌باشد، استفاده نمود.

ج- با توجه به محدود و کم بودن میزان مقاومت، حتی در گونه‌های یونجه یکساله مقاوم به سرما، و نیز

منابع

- امینی‌دهقی، م.، مدرسی ثانوی، ع. و حیدری شریف آباد، ح. ۱۳۸۲. بررسی ثبیت نیتروژن و گره‌زایی سه رقم یونجه یکساله در دمای مختلف منطقه ریشه و دمای پائین هوا. مجله علمی کشاورزی ۲۶، ۱: ۲۷-۴۵ ص.
- امینی‌دهقی، م.، مدرسی ثانوی، ع.، حیدری شریف آباد، ح. و قلاوند، ا. ۱۳۸۲. اثرات دمای مختلف منطقه ریشه بر روی صفات مرغولوژیکی یونجه یکساله. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۳، ۱۹۴-۱۸۳ ص.
- امینی‌دهقی، م. و مدرسی ثانوی، ع. ۱۳۸۴. رشد و نمو سه گونه یونجه یکساله در دمای مختلف منطقه ریشه و دمای پائین هوا. مجله دانش کشاورزی ۱۸۵، ۱۵: ۱۹۵-۱۸۵ ص.
- امینی‌دهقی، م.، مدرسی ثانوی، ع. و حیدری شریف آباد، ح. ۱۳۸۵. تاثیر جنستین بروی رشد و نمو سه گونه یونجه یکساله تحت تنش دمای پایین خاک. مجله علمی کشاورزی ۴: ۲۹-۱۵ ص.
- پیله‌وری، م و حسینی عراقی، م. ۱۳۵۹. تناوب زراعی مرتع و غله. گزارش دفتر فنی مرتع، سازمان جنگل‌ها و مراعع کشور، ۱۲۵ ص.
- ترک‌نژاد، ا. ۱۳۷۸. بررسی پتانسیل‌های اکولوژیکی یونجه‌های یکساله ایران، پایان‌نامه دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ۲۱۲ ص.
- حیدری شریف‌آبادی، ح. و ترک‌نژاد، ا. ۱۳۷۹. یونجه‌های یکساله، انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراعع کشور، ۱۶۷ ص.
- حیدری شریف‌آبادی، ح. ۱۳۸۱. نباتات علوفه‌ای (نیام داران) جلد اول، انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراعع کشور، ۳۱۱ ص.
- خلیلی، ق. ۱۳۷۰. اثر مقادیر مختلف میزان بذر و کود ازته بر عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی یونجه یکساله کولتیوار snail از گونه *Medicago scutellata*. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۵۷ ص.
- سنگل، ع. و ملک‌پور، ب. ۱۳۷۳. مروری بر تحقیقات انجام شده و در حال اجرا در رابطه با یونجه‌های یکساله در ایران و تدوین برنامه کاری آینده، نشریه موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراعع کشور، ۱۰۳: ۲۲ ص.
- میرزایی ندوشن، ح. ۱۳۸۰. یونجه‌های یکساله (زنگیک و اصلاح)، انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراعع، ۲۱۳ ص.
- میرنژاد، م. ۱۳۷۶. اثر تراکم کاشت بر عملکرد بذر دو گونه یونجه یکساله، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۶۱ ص.
- Abd El Moneim, A. M. and Cocks, P. S. 1986. Adaptation of *Medicago rigidula* to a cereal-pasture rotation in north-west Syria. Journal Agricultural Science Camb, 107:179-186.
- Amini Dehaghi, M. and Modarres, S. A. M. 2003. Effect of root-zone temperature on morphology, growth and development, yield and components of annual medics. Australian Journal of Agricultural Research, 54: 917-921.
- Appelbaum, E. 1990. The Rhizobium/ Bradyrhizobium-legume symbiosis. In P.M. Gresshof, ed., Molecular Biology of symbiotic Nitrogen Fixation, pp. 131-158. CRC press, Boca Raton, FL.
- Azizi, K., Amini Dehaghi, M. and Abbasipour, H. 2004. Effect of different air and root- zone tempratures on nitrogen fixation and nodulations of annual medics. Journal of Agronomy, 3 (2): 131-136.
- Barz, W. And welle, R. 1992. Biosynthesis and metabolism of isoflavones and pterocarpan phytoalexins in chickpea, soybean and phytopathogenic fungi. In H.A. Stafford, and R.K. Ibrahim, eds., Recent Advances in Phytochemistry 26: Phenolic Metabolism in plants, pp. 139-164. Plenum press, New Rork, NY.
- Bauchan, G. R., Veronesi, F., and Rosellini, D. 2000. Use of annual medics in sustainable agriculture systems. Lucern and medics for the XXI cenury. Proceeding XII Eucarpia Medicago spp. University di prugia, Italy: 146-153.

- Biderbeck, V. O., Bouman, D. T., Looman, J., Slinkard, A. E., Bailey, L. D., Rice, W. A., and Janzen, H. H. 1993. Productivity of four annual legumes as green manure in dryland cropping systems. *Agronomy Journal*, 85: 1035-1043.
- Chatterton, L. and Chatterton, B. 1996. Sustainable dryland farming: Combining farmer innovation and pasture in a Mediterranean Climate. Cambridge, UK, Cambridge University press, 217 P.
- Clarkson, N. M. and Russel, J. S. 1979. Effect of temperature on the development of two annual medics. *Australian Journal of Agriculture Research*, 30: 909-916.
- Cocks, P. S. 1992. Plant attributes leading to persistence in grazed annual medics (*Medicago* spp.) growing in rotation with wheat. *Australian Journal of Agricultural Research*, 43: 7, 1559-1570.
- Cocks, P. S. 1993. Seed and seeding dynamic over four consecutive years from a single seed set of six annual medics (*Medicago* spp.) in North Syria. *Experimental Agriculture*, 29: 421-422.
- Cocks, P. S. and Ehrman, T. A. M. 1987. The effect of geographic origin on frost tolerance of pasture legumes in Syria. *Journal of Application Ecology*, 24: 673- 683.
- Coventry, D. 1993. Improving Wheat –Belt pastures in Southern Australia. Final Report Summaries, 1993-1994. WWW.grdc.com.au/growers/res_summ/dav.
- Crocker, G. T. and Holford, R. 1996. Effects of fallow management and cropping sequences on production and residual N uptake in wheat. Proceeding of the 8th Australian Agronomy Conference , Toowoomba, Queensland, Australia, 30 January, 2 February, 176-179.
- Dalal, R. C., strong, W. M., Weston, E. J., Cooper, J. E., Lahance, K. J., King, A. J. and Chiken, C. J. 1995. Sustaining productivity of a Vertisol at Wara, Queensland with fertilisers, no-tillage, or legumes 1. Organic matter status. *Australian Journal of Experimental Agriculture*, 35: 903-913.
- Denarie, R. M. and Roche, P. 1992. Rhizobium nodulation signals. In: Molecular Signals in Plant Microb Communication, ed. Verma D. P. S., pp. 295-324. CRC Press, Boca Raton, FRL.
- Doughton, J. A., McNamara, G., Strong, M. W. G., Saffigna, P. G. and Mohammad, A. 1996. Managing nitrogen in cropping systems following legume leys. Proceeding of the 8th Australian Agronomy Conference. Toowoomba, Queensland, Australian Society of Agronomy Inc.: 215-218.
- Ehrman, T. A. M. and Cocks, P. S. 1990. Ecogeography of annual legumes in dryland. *Agronomy Journal*, 63: 359-362.
- Elias, K. S. and Safir, G. R. 1987. Hyphal elongation of *Glomus fasciculatus* in response to root exudates. *Applied Environment Microbiology*. 53:1928-1933.
- Francis, C. M. 1988. Selection and agronomy of medics for dryland pasture in Iran. Project Tcp/IRAN/6652.
- Fyson, A. and sprent, J. I. 1982. The development of primary root nodule on *Vicia faba* L. grown at two root temperatures. *Annual Botany*, 50:681-692.
- Gibson, A. H. 1971. Factors in the physical and biological environment affecting nodulation and nitrogen fixation by legume, *Plant soil*, Special Vol.:139-152.
- Glasziou, K. T. 1969. Control of enzyme formation and inactivation in plants. *Annual Revue Plant Physiology*, 20:63-88.
- Graham, D. and Patterson, B. D. 1982. Responses of plants to low, nonfreezing temperatures: Protein, metabolism, and acclimation. *Annual Revue Plant Physiology*. 33:347-372.
- Halverson, L. J. and Stacey, G. 1984. Host recognition in the Rhizobium soybean symbiosis: Detection of a protein factor in soybean root exudates which is involved in the nodulation process. *Plant Physiology*, 74: 84-89.
- Hanson, C. H. 1988. Alfalfa improvement and production. *Journal of the American Society of Agronomy*, 39: 350-353.
- Hardy, R. W., Holstein, W. F., Jackson, E. K. and Burns, R. C. 1968. The acetylene-ethylene assay for N₂ fixation: Laboratory and field evaluation. *Plant Physiology*. 43: 1185-1207.

- Holford, I. C. R. and Crocker, G. J. 1997. A comparison of chickpeas and pasture legumes for sustaining yield and nitrogen status of subsequent wheat. Australian Journal of Agriculture Research, 48: 305-315.
- Jeranya, P., Hesterman, O. B. and Shearer, C. C. 1998. Planting date effect on dry matter and nitrogen accumulation when clear seeded or intercropping with corn. Agronomy Journal, 90: 616 – 622.
- Jones, F. R. and Tisdale, W. B. 1921. Effect of soil temperature upon the development nodules on the root certain legumes. Journal of Agriculture Research, 22: 17-37.
- Krall, J., Groose, R. W. and Sobels, J. 1996. Winter survival of Australian winter pea and annual medic on the Western High Plains. p. 237-240. In: J. Janick (ed.), Progress in new crops. ASHS Press, Alexandria, VA.
- Kumarasinghe, R. M. K. and Nutman, P. S. 1979. The influence of temperature on root hair infection of *Trifolium parviflorum* and *T. glomeratum* by root nodule bacteria. I. The effects of constant root temperature on infection and related aspects of nodule development. Journal of Experimental Botany, 30: 503-515.
- Lal, R., Regnier, E., Eckert, D. J., Edward, W. M. and Hammond, R. 1991. Expectation of cover crops for sustainable agriculture. In: Hargrove, W. L. cover crops for clean water. Ankeny, IA: Soil and Water conservation society.
- Lane, G. A., Sutherland, O. R. W. and Skipp, R. A. 1987. Isoflavonoids as insect feeding deterrents and antifungal components from root of *Lupinus angustifolius*. Journal of Chemo Ecology. 13:771-783.
- Legros, P. and Smith, D. L. 1994. Root zone temperature sensitivity of nitrogen fixing and nitrate supplied soybean [*Glycin max* (L.) Merr. Cv. Maple Arrow] and lupin (*Lupinus albus* L. cv. Illtra) plants. Environment Experimental Botany, 34: 117-784.
- Lerouge, L., Roch, P., Faucher, C., Mailet, F., Truchet, G., Prome, J. C. and Denarie, J. 1990. Symbiotic host-specificity of *Rhizobium meliloti* is determined by a sulphated and acylated glucosamine oligosaccharide signal. Nature. 344:781-784.
- Lie, T. A. 1981. Environmental physiology of the legume-rhizobium in nitrogen fixation. In: Ecology, Vol. 1, ed. Broghton, W. J., pp. 104-134. Clarendon press Oxford, London, England.
- Lindemann, W. C. and Ham, G. E. 1979. Soybean plant growth, nodulation , and nitrogen fixation as affected by root temperature. Soil Science Society American Journal, 43:1134-1137.
- Long, S. R. 1989. Rhizobium-legum nodulation: Life together in the underground. Journal Cell. 56:203-214.
- Lynch, D. H. and Smith, D. L. 1993. Soybean [*Glycine max* (L.) Merr.]nodulation and N₂ fixation as affected by period of exposure to a low root zone temperature. Plant Physiology, 88:212-223.
- Materon, L. A. and Cocks, P. S. 1988. Constraints to biological nitrogen fixation in ley – farming systems designed for west Asia. In: Murrell, W. G., and Kennedy, I. R. Microbiology in Letchworth Hertfordshire, Engeland : Research studies press LTD: 93: 205 P.
- Matthews, D. J. and Hayes, P. 1982. Effect of root zone temperature on early growth, nodulation and nitrogen fixation in soybeans. Journal of Agricultural Science Camb. 98:371-376.
- Millhollon, E. P. and Williams, L. E. 1986. Carbohydrate partitioning and the capacity of apparent nitrogen fixation of soybean plants grown outdoors. Plant Physiology, 81: 280-284.
- Muyekho, F. J. N. 1993. Environmental and Agronomic factors affecting seed production in annual medics. Ph. D. Thesis university of Adelaide. 232 P.
- Peters, N. K. and Verma, D. P. S. 1990. Phenolic compounds as regulators of gene expression in plant-microbe interactions. Molecular Plant-Microbe Interaction, 3: 4-8.
- Puckridge, D. W. and French, R. J. 1983. The annual Legume pasture in cereal- Ley farming systems of southern Australia: a review. Agriculture Ecosystems and Environment 9: 229-267.
- Radwan, M. S., AL- fakhry, A. M., and AL – Hassan, A. M. 1978. Some observations on the performance of annual medics in north Iraq. Mesopotamia Journal of Agriculture, 13: 55 – 67.

- Roughly, R. J. and Date, R. A. 1986. The effect of strain of Rhizobium and of temperature on nodulation and early growth of *Trifolium semipilosum*. Experimental of Agriculture, 22: 123-131.
- Rumbaugh, M. D., and Johnson, D. A., 1986. Annual medics and related species as reseeding legume for north Utah pasture. Journal Range Management , 39: 52 – 58.
- SAS Institute Inc. 1997. SAS User's Guide. Statistical Analysis Institute Inc. Cary, North Carolina.
- Shrestha, A., Fisk, J. W., Jeranyama, P., Squire, J. M., and Hesterman, O. B., 2001. Annual Medics. Department of crop and soil science Michigan State University.
- Sims, J. R, S. Koala, R. L. Ditterline and L. E. Wiesner, 1985. Registration of 'George' blak medic (*Medicago polymorpha*) Crop Science, 25: 709-710.
- Sloger, C., Bezdicek, D., Milberg, R. and Boonkerd, N. 1975. Seasonal and diurnal variation in N₂ (C₂H₂)-fixing activity in field soybean. In W. D. P. Steward, ed., Nitrogen Fixation by Free-Living Microorganisms, pp. 271-284. Cambridge University Press, London.
- Sprent, J. I. and Minchin. F. R. 1985. Rhizobium, nodulation and nitrogen fixation. In: Grain Legume Crops, eds. Summerfield R. J. and Robert E. H. pp.115-143. Collins and Sons, London.
- Sprent, J. I. and Sprent, P. 1990. Nitrogen Fixing Organisms. Chapman and Hall, New York. 249p.
- Steel, R. G. D. and Torrie, J. H. 1980. Principles and procedures of statistics: a Biometric Approach. 2nd Edition, McGraw-Hill, New York, NY. 633p.
- Thomas, R. J. and Sprent, J. I. 1984. The effects of temperature on vegetative and early reproductive growth on a coil-tolerant and a cold-sensitive line of *Phaseolus vulgaris* L. 1. Nodulation, growth and partitioning of dry matter, carbon and nitrogen. Annul Botany. 53: 579-588.
- Verma, D. P. S. 1992. Signals in root nodule organogenesis and endocytosis of rhizobium. Plant Cell, 4: 372-382.
- Walsh, K. B. and Layzel, D. B. L. 1986. Carbon and nitrogen assimilation and partitioning in soybeans exposed to low root temperatures. Plant Physiology, 80: 249-255.
- Walsh, M. J., Krall, J. M. and Groose, R. W. 1998. Effect of time of planting on the growth and development of annual medics (*Medicago spp*) in Eastern Wyoming. Department of plant science , university of Wyoming , Laramie, 82071-3354.
- White, P. F., Nersoyan, N. K. and Christiansen, S. 1994. Nitrogen Cycling in a semi – arid mediterranean region: changes in soil N and organic matter under several crop / livestock production systems. Australian Journal of Agriculture Research, 45: 1293 –1307.
- Willemot, C. 1975. Stimulation of phospholipid biosynthesis during frost hardening of winter wheat. Plant Physiology, 55:356-359.
- Zhang, F. and Smith, D. L. 1994. Effects of low root zone temperature on the early stages of symbiosis establishment between soybean [*Glycine max* (L.) Merr.] and *Bradyrhizobium japonicum*, Journal of Experimental Botany, 279:1467-1473.
- Zhang, F. and Smith, D. L. 1995. Preincubation of *Bradyrhizobium japonicum* with genistein accelerates nodule development of soybean [*Glycin max* (L.) Merr.] at suboptimal root zone temperatures. Plant Physiology. 108:961-968.
- Zhang, F., Lynch, D. H. and Smith, D. L. 1995. Impact of low root temperatures on soybean [*Glycin max* (L.) Merr.] on nodulation and nitrogen fixation. Journal of Environmental and Experimental Botany 35: 276-285.
- Zhang, F., Dashti, N., Hynes, R. K. and Smith, D. L. 1996. Plant growth promoting rhiobacteria and soybeab [*Glycin max* (L.) Merr.] nodulation and nitrogen fixation at suboptimal root temperatures. Annual Botany, 35:279-285.
- Zhu, Y. Sheaffer, C. C., Russel, M. P. and Vance, C. P. 1998. Dry matter accumulation and dinitrogen fixation of annual *Medicago* species . Agronomy Journal, 90: 103 –108.

Effect of Different Planting Date and Genestine Concentrations on Nodulation and Nitrogen Fixation of Three Annual Medics

Amini Dehaghi^{1*}, M., Sephari², A. and Azizi³, K.

Abstract

An experiment was conducted in farm condition to study the effect of different planting dates and genestine concentrations on nodulation and nitrogen fixation of three medicgo species for two years, (2004 - 2005). Three medicago species, in clouding *Medicago polymorpha*, *M.radiata*, *M.rigdula* which are suitable for cold and temperate zone were used. Planting dates on three levels, 20th of Feb, first and ,10th of March was considered as main plot, the medicago species as sub plot and genestine concentration in 2 levels of 0 and 20 Micromole/Liter in secondary plot considered as sub sub plot. The experiment performed with four replications in split -split- plot base on the complete randomized blocks design. The result showed that at first year, in accordance with more suitable temperature at the beginning of growing season, the medicago species had better growth, nodulation and nitrogen fixation than the second year which unsuitable temperature at the beginning of growing season was more long. The result in according to nodulation, nitrogen fixation and all other searchable characteristics have significant difference and *M. polymorpha* has better ability in nitrogen fixation and is better from the point of nodulation ,nitrogen fixation, nitrogen percent and quantity of dry maters of root than other species. On third planting date, because of favorite air and soil temperature ,nodulation and nitrogen fixation was at highest level in Medicago species, but in first planting date measure of nodulation and nitrogen fixation was at the lowest level in Medicago species because of the bad effect of low temperature of air and soil on growing, nodulation and nitrogen fixation. The use of genestion has a significant improving effect on nodulation and nitrogen fixation in medicago species. It represents the moderating mark of genestine and its role in declining the negative effect of low environmental temperature on nodulation and nitrogen fixation of medicago species. The study of corresponding effects of care and attendance showed that the use of genestine in the first planting date on all species under test causes the goosing rate in nodulation and nitrogen fixation. It represents the effect of genestine to make the plant withstanding toward cold for improving nodulation and nitrogen fixation of medicago species in farming conditions.

Keywords: Annual medicago, Planting date, Nitrogen fixation, Genestine concentration, Nodulation

1. Assistant Professor, Agronomy Department, Faculty of Agricultural Sciences, Shahed University, Tehran

2. Assistant Professor, Agronomy Department, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan

3. Assistant Professor, Agronomy Department, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khoramabad

*: Corresponding Author